

Kosten van de behandeling

U kunt met een door ons opgestelde begroting met bijbehorende codes bij uw zorgverzekering nakijken wat u vergoed krijgt.
De visie van onze praktijk is dat iedere patiënt weet welk behandelplan hij/zij de komende jaren kan verwachten. Overleg met uw tandarts wat uw meerjarenplan is.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid

Telefoon: 033 - 461 33 34
Maandag t/m donderdag: 08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 -15.00 uur

Buiten deze uren kunt u voor pijnklachten met de spoedlijn bellen.
Telefoonnummer: 0900 – 1515.
Via de doktersdienst komt u dan bij de dienstdoende tandarts terecht.

T.X. de Jong
T A N D Z O R G



T.X. de Jong
T A N D Z O R G

Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl

2017-07

Het verwijderen van
een tand of kies

De behandeling

Er zal bij u binnenkort een tand of kies of meerdere elementen verwijderd moeten worden. Deze behandeling wordt altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Indien u bloedverdunders gebruikt, wilt u dan met uw arts kortsluiten of er gestopt moet worden met het medicijn? Bent u onder controle bij de trombosediens, wilt u dan aangeven dat op de dag van de ingreep de INR waarde onder 3.5 moet zijn.

Pijn

De verdoving is na één tot drie uur uitgewerkt en het is normaal dat u dan de wond voelt. Bij pijn kunt u een pijnstillert zoals paracetamol innemen, het kan ook zijn dat de tandarts u een pijnstillert heeft voorgeschreven. Volg het advies van de bijsluiter. Wij raden het af om bloedverdundende pijnstillers zoals aspirine te gebruiken.

Eten en drinken

Wij adviseren u om voorafgaand aan de afspraak goed te eten. Na de behandeling raden wij het nuttigen van warme dranken en gerechten gedurende de hele dag na de behandeling af. Door het gebruik van warme vloeistoffen neemt de doorbloeding in de mond toe, wat de kans op een nabloeding vergroot. Als de verdoving is uitgewerkt, mag u gerust weer voorzichtig eten en drinken. Wacht altijd met kauwen totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt. Anders blijft u misschien op uw wang of lip.

De eerste 24 uur na de behandeling adviseren wij u:

- rustig aan te doen
- naar behoefte een pijnstillert te nemen.
Volg daarbij het advies van de bijsluiter
- niet te spoelen, drinken mag wel
- geen melkproducten te nuttigen, omdat deze bacteriegevoelig zijn
- geen alcohol te drinken, want dit heeft een bloedverdundend effect
- niet te roken, alcohol en nicotine vertragen de wondgenezing.

Wondgenezing

Na het verwijderen van een tand of kies is er een wond(je) ontstaan, dat in de regel na ongeveer tien dagen helemaal dicht zal zijn. De wond geneest het best wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Lees hiervoor de onderstaande adviezen aandachtig door.

Spoelen

Spoel uw mond de eerste dag niet, ook niet met water. Dit verwijdert het gestolde bloed. Na een dag kunt u spoelen met Perio-Aid 0,12%.

Poetsen

Na de behandeling kunt u weer dagelijks poetsen. Wees echter voorzichtig op de plaats waar de tand en/of kies verwijderd is. Maak met uw tandenborstel zacht ronddraaiende bewegingen op het tandvlees. Dit stimuleert de doorbloeding en bevordert de genezing.

Welke klachten kunnen er optreden?

Nabloeding

Na de behandeling dient u 30 minuten op een gaasje dicht te bijten. Zodra dit gaasje is verwijderd, kan de wond nog een beetje nabloeden. Leg dan nieuwe gaasjes - die u van ons meekrijgt - tweemaal dubbelgevouwen op de wond. Bijt daar nog ongeveer een kwartier op. Indien de bloeding niet ophoudt, neemt u dan contact met ons op.

Koorts

Een beetje koorts na het verwijderen van een tand of kies is normaal. Neem contact met ons op wanneer de lichaamstemperatuur oploopt tot 39 graden of meer.

Zwelling

Het kan zijn dat er een lichte zwelling ontstaat. Dit kunt u verminderen door op de plek waar de tand of kies verwijderd is, met een coolpack of een koude kompres 5 minuten regelmatig te koelen. De zwelling kan nog tot drie dagen na de behandeling toenemen. Tevens kan de huid van de wang eerst blauw (bloeduitstorting) en daarna geel verkleuren. Dit trekt na enkele dagen weg. Blijft de zwelling toenemen, of krijgt u slikklachten, neem dan contact met ons op.

Ontsteking

Er kan sprake zijn van een ontsteking indien:

- de gevoeligheid na een paar dagen niet afneemt, of duidelijk toeneemt
- u een vieze smaak in de mond krijgt
- de zwelling pas na enkele dagen optreedt.

In dat geval is het verstandig contact met ons op te nemen.