

### Zwelling

De eerste 2 uur na de behandeling kunt u de wang met een coolpack 5 minuten op en af koelen om eventuele zwelling te voorkomen. Het kan zijn dat er een lichte zwelling en/of een blauwe plek ontstaat, maar die trekt na enkele dagen weg.

### Klachten

De volgende klachten komen af en toe voor:

- blauwe plekken op de kin;
- prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang;
- lichte napijn (neem eventueel een paracetamol, géén aspirine).

### Stap 3 • Nazorg (afpraak van 15 minuten)

Een week na het implanteren zien wij u terug. U wordt verzocht dan uw elektrische tandenborstel mee te nemen. Er wordt gekeken of de wondjes goed genezen, de prothese nog aangepast moet worden, u de tijdelijke dopjes op de implantaten goed schoon kunt houden en de mondhygiëne op peil is.

### Stap 4 • Tijdelijke knopjes door drukknopjes of steg vervangen (afpraak van 15 minuten)



Acht tot tien weken na het plaatsen van de implantaten zien wij u terug om de tijdelijke dopjes op de implantaten door drukknoppen of steg te vervangen. Bij het plaatsen van de drukknoppen of steg zijn de implantaten sterk in het bot verankerd. Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt.

### Stap 5 • Vervaardigen van de gebitsprothese op implantaten

Dit gebeurt meestal in 6 afspraken van 30 minuten bij de tandtechniker. Bij de eerste twee afspraken worden er afdrukken van uw kaken gemaakt. Tijdens de volgende afspraken wordt er gemeten hoe u dichtbijt en gaat u de prothesen passen. Indien er nog iets aangepast moet worden, past u nog een keer. Tijdens de laatste afspraak worden zowel de nieuwe boven- als onderprothese geplaatst.

### Controle

Wij zien u graag eens per jaar voor controle van de implantaten, gebitsprothese en mondgezondheid terug. Met een constante goede mondverzorging en controle door uw tandarts bent u van een lange levensduur van de implantaten verzekerd.

### Kosten van de behandeling

In de meeste gevallen wordt de behandeling vanuit de AWBZ-verzekering vergoed. Wij vragen een machtiging voor u aan. Houdt u rekening met uw eigen risico en een eigen bijdrage.

### Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

### Telefonische bereikbaarheid

Telefoon: 033 - 461 33 34  
Maandag t/m donderdag: 08:00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21:00 uur  
Vrijdag: 08:00 - 15:00 uur

Buiten deze uren kunt u voor pijnklachten bellen met de spoedlijn.

Telefoonnummer: 0900 - 8602.

Via de doktersdienst komt u dan bij de dienstdoende tandarts terecht.

**T.X. de Jong**  
T A N D Z O R G



De gebitsprothese op  
implantaten


**T.X. de Jong**  
T A N D Z O R G

Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort  
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl

2021-06

U heeft het advies gekregen uw gebitsprothese op implantaten te laten plaatsen. In deze folder leest u wat een implantaat is, wat de voordelen hiervan zijn en wat het behandeltraject kan inhouden.

### Wat is een gebitsprothese op implantaten?



Dit is een uitneembare gebitsprothese, ook wel een overkappings- of klikprothese genoemd, die door middel van drukknoppen op implantaten vastklikt en deze overkapt. Dankzij het vastklikken, zit de prothese 'vast' op de kaak. Het kauwen verbetert en het slinken van de kaak wordt aanzienlijk vertraagd.

### Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst en daarin vastgroeit. Implantaten zijn van titanium vervaardigd, een materiaal dat goed door het lichaam wordt geaccepteerd. Ze vormen de basis waarop een prothese wordt vastgezet. Het slagingspercentage ligt heel hoog: in de bovenkaak is dit 95% en in de onderkaak zelfs 98%. Implantaten kunnen vrijwel altijd worden geplaatst, mits de mondhygiëne goed is.

### Prothese op locators (drukknoppen)

Op de implantaten worden locators (drukknoppen) bevestigd. Daar wordt de prothese op vastgeklikt. U kunt de drukknoppen het beste schoon houden met een elektrische tandenborstel.



### Prothese op steg

Een steg is een staafje dat is aangebracht op de implantaten. Aan het gebitsgedeelte wordt een haakje gemonteerd dat in de steg grijpt. Er kan voor deze manier van inklikken gekozen worden wanneer de onderkaakwal niet zo hoog is of wanneer de tongspier heel krachtig is.



### Voordelen van een gebitsprothese op implantaten.

- ✓ zorgeloos kunnen lachen;
- ✓ goed kunnen kauwen, wat de spijsvertering ten goede komt;
- ✓ de gebitsprothese valt niet meer uit uw mond;
- ✓ meer het gevoel uw eigen tanden en kiezen te hebben doordat het comfortabel aanvoelt;
- ✓ de kaak slinkt niet of nauwelijks verder;
- ✓ implantaten zijn een duurzame oplossing;
- ✓ u zal zich zekerder voelen.

### Het behandeltraject

In het algemeen bedraagt de ingroeifase van het implantaat in de bovenkaak 3 à 4 maanden en in de onderkaak 2 maanden. Vanaf het intakegesprek, de behandeling, de nazorg tot het plaatsen van de gebitsprothese is de gemiddelde doorlooptijd een half jaar.

Er zijn doorgaans 5 stappen:

1. intake bij de implantoloog;
2. implanteren;
3. nazorg;
4. tijdelijke dopjes op implantaten vervangen door drukknopjes of steg;
5. vervaardigen van de gebitsprothese op implantaten in meerdere afspraken.

### Stap 1 • Intake bij de implantoloog (afpraak van 30 minuten)

De implantoloog heeft informatie met betrekking tot uw algehele gezondheid nodig. Er wordt een mondonderzoek gedaan en eventueel een röntgenfoto gemaakt. Daarna zal hij zijn advies met u bespreken, rekening houdend met uw wensen en verwachtingen. Als u ervoor in aanmerking komt, dient de implantoloog een aanvraag bij uw zorgverzekeraar in. Meer informatie over vergoeding van de behandeling leest u in deze brochure.

### Stap 2 • Implanteren (afpraak van 60 minuten)


Bij deze stap - het plaatsen van de implantaten - treft u uitleg aan over de medicatie voorafgaand aan de behandeling, het verloop van de behandeling en wat u daarna kunt verwachten.

#### Medicatie voorafgaand aan de behandeling

Bij het maken van de afspraken krijgt u een recept en begeleidend schrijven mee. Wij adviseren u deze medicijnen vroegtijdig bij de apotheek op te halen en in te nemen zoals voorgeschreven. Het is belangrijk te weten of u met het innemen van eventuele bloedverdunders moet stoppen en hoeveel dagen voor de behandeling dat nodig is. Is uw INR-waarde lager dan 3,5, dan kunnen we met de behandeling doorgaan. Gebruikt u bloedverdunders, neem dan contact op met uw arts.

#### Het verloop van de behandeling

U wordt plaatselijk verdoofd op de plek waar de implantaten komen. Daarna zal de implantoloog de implantaten plaatsen. Uw huidige gebitsprothese wordt ter hoogte van de implantaten uitgeslepen zodat u deze kunt blijven dragen en de implantaten niet worden belast. Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt. U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin precies staat vermeld door wie welke implantaten op welke locatie zijn geplaatst. U dient deze gegevens goed te bewaren. Mocht het nodig zijn, dan kan iedere andere arts of specialist



precies zien welke implantaten er in uw mond aanwezig zijn. Wellicht vindt u het prettig om iemand mee te nemen.

Na plaatsing van de implantaten krijgt u poetsinstructies. Het is van groot belang dat u de randen van de implantaten, de mond en de gebitsprothese goed poetst. U gebruikt daarvoor een pasta zonder schuurmiddel zoals is voorgeschreven. Zo zorgt u ervoor dat de hygiëne van uw mond en uw gebitsprothese optimaal wordt en zal blijven.

Indien u zich niet dagelijks aan deze instructies houdt, kunnen er complicaties zoals ontstekingen en een vervuilde gebitsprothese optreden. Op den duur kan dit leiden tot verlies van de implantaten.

#### Wat u na de behandeling kunt verwachten

De eerste 24 tot 36 uur na het implanteren adviseren wij u:

- rustig aan te doen;
- niet te roken! Dit vermindert de doorbloeding en vertraagt de wondheling;
- géén alcohol te drinken. Dit werkt bloedverdundend en verhoogt de kans op nabloeding;
- geen melkproducten te nemen omdat deze bacteriegevoelig zijn. Mocht u die toch nuttigen, drink daarna dan een glas water om ervoor te zorgen dat er geen slijmrestjes in de mond achterblijven.

Om de implantaten niet te belasten, adviseren wij u na het implanteren gedurende 8 tot 12 weken niet te hard te bijten- en uw eten goed klein te snijden of te prakken.

#### Anesthesie

Vaak is de plaatselijke verdoving 1,5 tot 2 uur na de behandeling uitgewerkt. Let er tot die tijd op dat u zich niet aan warm eten of drinken brandt of ongemerkt op uw lip of wang bijt.

#### Napijn

Eventuele napijn is afhankelijk van het verloop van de behandeling. Bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees en vliesje (perioost) eromheen wel. Is het tandvlees gehecht of is er bot bijgeplaatst, dan kan dat na het uitwerken van de verdoving gevoeliger zijn.