

Kosten van de totale behandeling

De kosten van de totale behandeling liggen tussen de € 5.500 en € 9.500. In sommige gevallen wordt de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Wij vragen dan een machtiging voor u aan. Er geldt hiervoor een wettelijke eigen bijdrage. Houdt u tevens rekening met uw eigen risico. De kosten van de controle en de eventuele reiniging van implantaten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid

Telefoon: 033 - 461 33 34
Maandag t/m donderdag: 08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 -15.00 uur

T.X. de Jong
T A N D Z O R G



T.X. de Jong
T A N D Z O R G

T.X. de Jong Tandzorg • Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl

2018-06

Een bovengebityprothese
op implantaten

U heeft het advies gekregen een bovengebitsprothese op implantaten te laten plaatsen. In deze folder informeren wij u over implantaten in een tandeloze bovenkaak, wat de voordelen hiervan zijn en hoe het behandeltraject verloopt.

Waarom een bovengebit op implantaten?

Als al uw tanden en kiezen verwijderd zijn, zullen uw kaken in de loop van de jaren slinken. Als gevolg hiervan kan uw gebitsprothese los gaan zitten. Met behulp van 4 tot 6 implantaten in de bovenkaak kan er meer houvast aan de gebitsprothese worden gegeven.

Dankzij het vastklikken zit de prothese 'vast' op de kaak. Het kauwen verbetert en het slinken van de kaak wordt aanzienlijk vertraagd.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst en daarin vastgroeit.

Implantaten zijn van titanium vervaardigd, een materiaal dat goed door het lichaam wordt geaccepteerd. Ze vormt de basis waarop de prothese vastklikt. Implantaten kunnen vrijwel altijd worden geplaatst, mits er een goede mondhygiëne is.

Voordelen van een bovengebit op implantaten:

- zorgeloos kunnen praten en lachen
- goed kunnen kauwen, wat de spijsvertering ten goede komt
- de gebitsprothese valt niet meer uit uw mond
- meer het gevoel uw eigen tanden en kiezen te hebben doordat het comfortabeler aanvoelt
- een kleiner/smaller verhemelteplaat, waardoor u meer smaak ervaart
- de kaak slinkt niet of nauwelijks verder
- u zult zich zekerder voelen

Het behandeltraject

In het algemeen bedraagt de ingroefase van een implantaat in de bovenkaak 3 à 4 maanden. Vanaf het intakegesprek tot het plaatsen van de gebitsprothese is de gemiddelde doorlooptijd 6 tot 9 maanden.

Er zijn doorgaans 6 stappen:

1. intakegesprek bij de implantoloog
2. voorbereiding
3. implanteren
4. nazorg
5. vrij leggen van de implantaten
6. vervaardiging van de gebitsprothese op implantaten in meerdere afspraken

1 Intake

De implantoloog heeft informatie over uw algehele gezondheid nodig. Er wordt een mondonderzoek gedaan en een foto gemaakt. Daarna zal hij zijn advies met u bespreken, rekening houdend met uw wensen en verwachtingen. Vervolgens ontvangt u een begroting met daarin het behandelplan en de bijbehorende kosten. Bij deze afspraak krijgt u veel informatie, misschien is het prettig om iemand mee te nemen.

2. Voorbereiding

Mondhygiëne

Om succesvol te implanteren is een goede mondhygiëne van groot belang. U kunt hiertoe het advies krijgen een afspraak met de mondhygiënist te maken. Die maakt samen met u een behandelplan en tijdsplanning om het tandvlees gezond te krijgen.

Medicatie voorafgaand aan de behandeling

U ontvangt een recept met begeleidend schrijven. Wij adviseren u de medicijnen vroegtijdig bij de apotheek op te halen en in te nemen zoals voorgeschreven. Gebruikt u bloedverdunders, neem dan contact op met uw arts. Het is belangrijk te weten of u moet stoppen met het innemen van uw medicijn. Is uw INR-waarde lager dan 3.5, dan kunnen we met de behandeling doorgaan.

CBCT-scan

Om een goed beeld van het botniveau te verkrijgen wordt er een CBCT-scan (driedimensionale foto) van uw kaak gemaakt.

Hoogte cholesterol en vitamine D

De waarden van cholesterol en vitamine D in uw bloed zijn van belang voor een succesvol resultaat. Wanneer het nodig is om dit te testen ontvangt u van ons verwijsbrief voor de huisarts of prikpunt.

3 Implanteren (afspraak van circa 120 minuten)

Hoe verloopt de behandeling en wat kunt u na de behandeling verwachten?

Het verloop van de behandeling

U wordt plaatselijk verdoofd op de plek waar de implantaten geplaatst worden.




Daarna zal de implantoloog het implantaat en eventueel extra bot plaatsen. Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt.

U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin precies staat vermeld welk implantaat op welke locatie is geplaatst. U dient deze gegevens goed te bewaren. Mocht het

nodig zijn, dan kan iedere andere arts of specialist zien welke implantaten er in uw mond aanwezig zijn.

Het plaatsen van extra bot

Mocht de kaak in de breedte en/of de hoogte bot tekort komen, dan kan het geslonken deel worden opgevuld.



In deze afbeelding is te zien dat een deel van het implantaat aan de linkerkant niet met bot bedekt is. De implantoloog zal het gebied waar zich te weinig bot bevindt opvullen en eventueel met een membraan bedekken. Tijdens de behandeling beslist de implantoloog of er extra bot bijgeplaatst moet worden. Uit voorzorg adviseren wij u, na de behandeling, niet zelf auto te rijden. Wellicht vindt u het prettig om iemand mee te nemen.

4 Nazorg (afspraak van 15 minuten)

Een dag, 1,5 week en een maand na het implanteren zien wij u in onze praktijk terug. Dan wordt er gekeken hoe de genezing vordert en of de huidige prothese nog aangepast moet worden.

U krijgt instructie hoe u het implantaat het best kunt onderhouden. Op die manier zorgt u ervoor dat de mondhygiëne optimaal zal blijven. Als u niet dagelijks goed poetst, kunnen er complicaties zoals ontstekingen optreden. Op den duur kan dit dan leiden tot verlies van het implantaat. Regelmatig bezoek aan de mondhygiënist is noodzakelijk. Ons advies is dit met uw halfjaarlijkse controle te combineren.

5 Vrijleggen van de implantaten (afspraak van 60 minuten)

Vier tot zes maanden na het plaatsen van de implantaten worden deze onder plaatselijke verdoving vrijgelegd. Op de implantaten wordt een locator geplaatst of, als er een steg is geïndiceerd, een healing abutment (heeldopje).

De indicatie voor locators of een steg is van meerdere factoren afhankelijk en zal vooraf met u besproken worden. Uw huidige prothese wordt aangepast, zodat u deze wel weer in kunt doen, maar nog niet kunt vastklikken.



6 Vervaardiging van de gebitsprothese op implantaten

Dit gebeurt meestal bij de tandtechniker in 6 afspraken van 30 minuten. Bij de eerste twee afspraken worden er afdrucken gemaakt en bij de derde afspraak wordt gemeten hoe u dichtbij. De daaropvolgende afspraken zijn bedoeld voor het passen en plaatsen van de bovenprothese.